URGOTUL SOUPLE

Interface lipido-colloïde non occlusive

Urgotul® Souple

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE Nombre UCD	GROUPAGE Nombre boîtes
8537	Petit : 5 x 5 cm	10	300	30
8538	Standard : 10 x 10 cm	10	160	16
8513	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14
8540	Large : 10 x 40 cm	10	100	10

www.URGOmedical.fr

LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • BP 157 • 21304 CHENÔVE CEDEX • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

URGOTUL SOUPLE



DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde non occlusive.

COMPOSITION : **Urgotul® Souple** est issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.
Urgotul® Souple est une interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive, non adhérente à la plaie, constituée d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose) et de vaseline.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul® Souple** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, **Urgotul® Souple** n'adhère ni à la plaie, ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Souple et très conformable, **Urgotul® Souple** épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS

- **Urgotul® Souple** est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), et des plaies chroniques (escarres, ulcères) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation, et des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale.
- Souple et très conformable, **Urgotul® Souple** est tout particulièrement indiqué dans le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles ainsi que pour le méchage des plaies creuses.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul® Souple**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul® Souple**.
- Appliquer directement **Urgotul® Souple** sur la plaie.
  Urgotul® Souple peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.
- Recouvrir **Urgotul® Souple** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou un filet tubulaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul® Souple** seront effectués tous les 2 à 4 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
- Dans les cas des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale, le renouvellement se fera tous les 1 à 3 jours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- **Urgotul® Souple** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul® Souple**.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, l'instauration d'un traitement préalable avec une interface anti-bactérienne est préconisée.
- En cas de plaie profonde, anfractueuse ou fistuleuse, laisser une partie du pansement **Urgotul® Souple** visible et accessible à l'extérieur de la plaie.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul® Souple** à plat, à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.
Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).
Tarif LPPR = Prix Limite de Vente.
Remboursé Sécurité Sociale à 65 %.

10/2009 - GM-40